

INDICACIONES DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL POR GRUPOS DE EDAD. CAMPAÑA 2018/19


- CHIROFLU -

❖ Vacunación entre 6 meses-15 años

La vacunación infantil (6 meses – 15 años) se realizará con **Chiroflu®** conforme a las siguientes consideraciones:

- ✚ En niños de 6 meses a 9 años que se vacunan por primera vez y que no han padecido nunca la gripe, deben administrarse *dos dosis separadas por un mes* (en < 3 años, cada dosis de 0,25 cc y en ≥ 3 años, de 0,5 cc). Las revacunaciones anuales posteriores se harán con una sola dosis de 0,25 cc en los < 3 años, y de 0,5 cc en los mayores de esta edad.
- ✚ Como norma general, si un niño < 9 años solo recibió una dosis el primer año que se vacunó, *el segundo año debe recibir dos dosis, y en los años sucesivos solo una.*
- ✚ Recordar reservar otra dosis de vacuna en el punto de vacunación fuera de las fechas de campaña para estas segundas dosis.

Presentación de envase, jeringas y aguja de seguridad de **Chiroflu®**:





- AFLURIA -

❖ Vacunación en personas > 15 años

- ✚ A todas las personas "mayores de 15 años pertenecientes a grupos de riesgo" y "de 60 o más años", se les administrará una dosis de vacuna trivalente inactivada de virus fraccionados **Afluria®**.
- ✚ La inmunización debe realizarse mediante inyección intramuscular o subcutánea profunda.
- ✚ Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas. La inmunización debe realizarse en extremidades distintas.
- ✚ **En ningún caso deben vacunarse con Afluria® niños menores de 5 años.**

Presentación de envase, jeringas y aguja de seguridad de **Afluria®**:



- **CHIROMAS** -

❖ **Vacunación en personas institucionalizadas**

La vacunación en las **personas residentes en centros socio sanitarios** se realizará de la siguiente manera:

- ✓ La vacuna antigripal adyuvada **CHIROMAS®**, indicada en la inmunización activa contra la gripe en las personas ≥ 60 años, y especialmente en los individuos con mayor riesgo de complicaciones asociadas.
- ✓ CHIROMAS® puede administrarse vía intramuscular haciendo presión durante 2 minutos tras la administración (no frotar ni masajear, solo presionar): la administración intramuscular en pacientes ancianos anticoagulados no da lugar a complicaciones hemorrágicas locales.

Presentación de envase, jeringas y aguja de seguridad de **Chiromas®**:



Santander a 17 de octubre de 2018
Directora General de Salud Pública

Fdo. Virginia Ruiz Camino

