


### Indicador de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas

El indicador de urgencias hospitalarias recoge los episodios de urgencia en personas de 15 a 54 años directamente relacionados con los efectos adversos o no deseados por consumo de sustancias psicoactivas. Se incluyen todos aquellos casos en los que en la notificación de urgencias o historia clínica médica se menciona consumo no médico o no terapéutico de drogas, excepto aquellos en que se cita únicamente consumo de alcohol, tabaco, antidepresivos, hipnóticos y antipsicóticos.

En Cantabria se viene recogiendo desde octubre de 2007 y se registran las urgencias de los hospitales de referencia: Hospital Universitario Marqués Valdecilla, Sierrallana, Tresmares y Laredo.

En el año 2013 se recogieron 1.880 episodios de urgencias hospitalarias en los que se mencionaba consumo no médico o no terapéutico de drogas psicoactivas, el 25,9 % de las urgencias recogidas estaban directamente relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Durante el periodo 2009-2013, aunque el número de urgencias en que se menciona el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado, las que están directamente relacionadas con su consumo han descendido (Gráfico 19).

GRAFICO 19. Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas directamente con el consumo de drogas. Cantabria 2009-2013



La mayor parte de las personas atendidas en el total de urgencias registradas fueron hombres en torno al 74%, sin que haya habido variaciones en estos años. Por otra parte, la edad media de las personas atendidas ha aumentando pasando de los 36,2 años en el año 2009 a los 37,2 en el 2013.

En cuanto a las urgencias directamente relacionadas con el consumo de drogas, las sustancias cuyo consumo se mencionó más frecuentemente en la historia clínica, tanto en los hombres como en las mujeres, han sido el alcohol (65,2%), los hipnosedantes (34%), el cannabis (17,3%) y la cocaína (14%) (Tabla 11).

TABLA II. Urgencias hospitalarias según las diferentes sustancias psicoactivas directamente relacionadas con el consumo de drogas (datos en %). Cantabria 2009-2013.

	2009	2010	2011	2012	2013
HEROÍNA	1,9	3,8	2,5	0,8	1,9
OTROS OPIÁCEOS	7,0	9,2	7,3	4,1	6,0
COCAÍNA	12,8	18,4	11,5	12,9	14,0
ANFETAMINAS	3,1	2,3	1,5	1,9	2,1
EXTASIS	0,6	0,6	0,5	0,0	0,0
KETAMINA	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
BENZODIACEPINAS	25,4	37,3	0,0	0,0	0,0
ALUCINÓGENOS	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2
HIPNOSEDANTES	0,0	0,0	27,3	34,4	34,0
CANNABIS	10,3	13,8	10,3	14,7	17,3
ALCOHOL	69,8	78,8	68,8	62,2	65,2

Con respecto a este último periodo 2009-2013, se aprecia una disminución de la proporción de urgencias por menciones de alcohol (69,8% en 2009 y 65,2% en 2013), sin embargo, la proporción de urgencias en las que se menciona el cannabis ha aumentado pasando de 10% en el año 2009 al 17,3% en 2013 (Gráfico 20).

GRAFICO 20. Evolución de la proporción de urgencias directamente relacionadas con el consumo de drogas en las que se menciona alcohol, hipnosedantes, cannabis y cocaína. Cantabria 2009- 2013.

